

## tabela de consolidaÇÃO de fraturas

osso fraturado	prazo médio de consolidaÇÃO	<u>duraÇÃO média da incapacidade</u>
clavícula	25 dias	2 ½ meses
Úmero extremidade superior	30 a 35 dias	2 ½ meses
Úmero corpo	30 a 35 dias	2 ½ meses
Úmero extremidade inferior	30 a 40 dias	3 meses
olecrânio	20 a 30 dias	2 meses
antebraço (ambos os ossos)	25 a 35 dias	2 ½ meses
cúbito	25 a 30 dias	-
extremidade inferior do rádio	25 a 30 dias	40 a 50 dias
metacarpiano	20 a 30 dias	2 a 3 dias
falange	15 a 20 dias	1 ½ mês
fêmur colo (extracapsular)	2 a 6 meses	6 meses
fêmur diáfise	60 dias	6 ½ meses
fêmur subcondiliana	4 a 6 meses	6 ½ meses
fêmur sub e intercondiliana	6 meses	1 ano
fêmur subcondiliana sem artrotomia	2 a 3 meses	6 meses a 1 ano
patela (rótula) após sutura	1 mês	2 meses
ambos os ossos da perna (fratura transversal)	35 a 40 dias	3 a 6 meses
ambos os ossos da perna (fratura oblíqua)	3 meses	3 a 6 meses
extremidade superior da perna	6 meses	12 a 18 meses
tíbia	30 a 40 dias	3 meses
fíbula (perôneo)	25 a 30 dias	2 a 3 meses
bimaleolar por adução	25 a 30 dias	1 ½ a 2 meses
bimaleolar por abdução	40 a 60 dias	5 meses
calcâneo por arrancamento	50 dias	3 a 4 meses
astrágalo	2 meses	4 a 6 meses
metatarsiano	20 a 30 dias	2 meses